



BOLUTECH™ Start

Redução do risco de cetose em vacas de leite



DISSOLUÇÃO
EM 3 DIAS

BENEFÍCIOS

Reduz o risco de cetose

Rápida ação

Estímula o apetite

Melhora o início da lactação


VANTAGENS

Cobre as necessidades recomendadas de niacina.

Limita os corpos cetônicos no sangue.

Optimiza a glicose disponível.

EVOLUÇÃO DOS CRITÉRIOS BIOQUÍMICOS EM VACAS
COM < 100 DIAS DE LACTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE DOIS BOLUS DE NIACINA



MODO DE UTILIZAÇÃO E DOSAGEM

Vacas de leite: um bolus, repetindo 3 dias depois dependendo do estado e apetite do animal. Aplicar no início da lactação e durante a 3ª a 6ª semanas após o parto como prevenção do risco de cetoses.


SABIA QUE?

A produção de leite de uma vaca atinge o pico entre a 4ª e a 6ª semana de lactação, no entanto o pico de ingestão só ocorre entre a 9ª e a 11ª semana. Esta situação coloca as vacas em déficit energético durante o primeiro terço da lactação.

O uso das reservas de gordura corporal para manutenção da produção leva a síntese de corpos cetônicos. A cetose deve-se à sua acumulação no sangue e o impacto negativo que tem na ingestão e produção. A niacina ajuda o fígado a transformar a gordura em glicose e estimula a ingestão e os micro-organismos do rúmen.



COMPOSIÇÃO



neolait

Cargill Company

BOLUTECH™ Start

Redução do risco de cetose em vacas de leite

APRESENTAÇÃO

Peso: 58 g, Diâmetro: 25 mm, Comprimento: 82 mm

COMPOSIÇÃO

Óxido de Magnésio, Maltodextrina

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Proteína Bruta: 44%, Cinza Bruta: 21%, Magnésio: 6%, Fibra Bruta: 0,1%, Gordura Bruta: 2%, Sódio: 0,01%

ADITIVOS

Oligoelementos	Por bolus de 58 g ⁽¹⁾	Por kg
Magnésio (óxido)	580 mg	10.000 mg
Cobalto (carbonato)	5,8 mg	100 mg
Vitaminas	Por bolus de 58 g ⁽¹⁾	Por kg
Niacina	36,250 mg	625.000 mg

⁽¹⁾ Taxa máxima de libertação diária de magnésio e cobalto

ADMINISTRAÇÃO

Para animais com partos gemelares, com problemas no parto (retenção placentária, febre do leite), ou condição corporal acima de 3.25: aplicar 1 bolus Bolutech™ Start 5 dias após o parto e repetir aos 8 dias.


EMBALAGEM

Disponível em: Embalagem de poliestireno com 10 bolus.
Bolutech™ Start 5 dias após o parto e repetir aos 8 dias.


INFORMAÇÃO ADICIONAL

O bolus fornece niacina, magnésio e cobalto durante 3 dias.
Garantir que a dose diária recomendada não é ultrapassada, tendo em conta a ração diária do animal.
Deve ser aplicado no início da lactação e durante as 3 a 6 semanas após o parto para prevenção de risco de cetoses.


VALIDADE 24 meses



Lavar, desinfetar e enxaguar o aplicador antes de usar em cada grupo de animais. Introduzir o bolus no cilindro do aplicador cuidadosamente.



Abrir a boca do animal e passar o aplicador cuidadosamente em direção à parte superior da cavidade oral. Durante esta operação, a cabeça do animal deve ser mantida direita e com o pescoço esticado.



Continuar a passar o aplicador cuidadosamente. Com um ou dois dedos da mão livre acariciar o interior da bochecha para facilitar o processo.



Uma vez o aplicador introduzido na posição correta, gentilmente apertar o o embolo para libertar o bolus. Se houver alguma resistência aquando da libertação o aplicador não está na posição correta. Retirar e repetir o processo de novo.



Video
Demonstrativo