

neolait



Cargill Company

BOLUTECH FLASH

Redução do risco de febre do leite e hipocalcemia subclínica



Dissolução
em 90 minutos



Sabia que?

Em média, a febre do leite afeta 5% das vacas leiteiras, mas mais de 50% das vacas multíparas têm hipocalcemia durante o parto.

Esta perturbação metabólica é muitas vezes invisível e conduz a uma diminuição do tónus muscular e da imunidade. Isto resulta num aumento da duração do parto, com sensibilidade à metrite.

Outra consequência direta é a perda de apetite e de ingestão de água. Isto aumenta o risco de deslocação do abomaso e favorece a cetose. Na Europa, a combinação dos custos associados a estas afeições e a diminuição do desempenho resulta numa perda económica significativa perto de 250€/vaca leiteira.



BENEFÍCIOS

- Redução do risco de febre do leite e hipocalcemia subclínica.
- Assegura o início da lactação e a produção de leite.




VANTAGENS DO PRODUTO

- Libertação rápida no rúmen (90 minutos).
- 2 fontes de cálcio orgânico de efeito rápido e retardado.
- Reforço do metabolismo do cálcio com vitamina D3.
- Reduz a falsa deglutição e a irritação das mucosas.
- Ação antioxidante (vitamina E).



Concentração plasmática de cálcio antes do parto (12d), após o parto (+12h e +28h) e no início da lactação (+10d), para os grupos de controlo e Flash.




— Bólus
— Controlo

FLASH diminui significativamente a prevalência de hipocalcemia subclínica de 56,2% para 25% em vacas leiteiras multíparas às 28 horas pós-parto com níveis sanguíneos mais elevados de vitamina E (2,2 vs. 1,4 µg/L).



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



* Mg: uma parte sob a forma de quelatos



BOLUTECH FLASH

Redução do risco de febre do leite
e hipocalcemia subclínica

neolait
Cargill Company



APRESENTAÇÃO

- Peso: 67 g - Diâmetro: 25 mm - Comprimento: 83 mm



COMPOSIÇÃO

- Maltodextrina, quelato de magnésio.



COMPONENTES ANALÍTICOS

Componentes	Por 4 bólus
Cálcio - 24,5%	66 g
Magnésio - 0,3%	0,8 g
Fósforo - 0,1%	0,2 g
Sódio - 0,1%	0,2 g



ADITIVOS

Conservantes	Por 4 bólus	Por Kg
Ácido fórmico (Formiato de cálcio)	143 600 mg	535 823 mg
Ácido propiónico (propionato de cálcio)	12 200 mg	45 553 mg
Vitaminas		
Vitamina D3	50 000 UI	186 600 UI
Vitamina E	8 000 mg	29 850 mg
Niacina (Vit PP)	12 000 mg	44 777 mg



EMBALAGEM:

Disponível em caixa de poliestireno de 20 bólus.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Vacas leiteiras no dia do parto:

- 2 bólus logo após o parto.
- 2 bólus 12 horas mais tarde (consoante o nível de produção, o peso e o estado de saúde da vaca).




CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

A suplementação simultânea de aditivos com um teor máximo de outras fontes aos incorporados num bólus, se aplicável, deverá ser evitada. Antes da aplicação, recomenda-se que consulte o seu Médico Veterinário e/ou nutricionista relativamente ao equilíbrio dos oligoelementos na ração diária e o estado dos oligoelementos do efetivo. Assegurar que a ingestão máxima dos aditivos não seja excedida, tendo em conta a ração diária do animal.




VALIDADE


18 meses




Limpar, desinfetar e enxaguar o aplicador antes do manuseamento de cada grupo de animais. Introduzir cuidadosamente os bólus no cilindro do aplicador.



Abrir a boca do animal e passar o aplicador com cuidado e suavemente na direção da parte superior da cavidade oral. Durante esta operação, a cabeça do animal será mantida estendida com o pescoço direito.



Continuar passando o aplicador cuidadosamente. Com um ou dois dedos da mão livre, toque no interior da bochecha para facilitar a operação.



Quando o aplicador estiver na posição correta, aperte suavemente a pega/êmbolo para distribuir os bólus. Se houver alguma resistência durante esta pressão, a posição do aplicador não está correta. Retire-o e repita a operação.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO