

PORCOMEL

CERTIFIED | the art of growing


PROGRAMA ALIMENTAR PARA NINHADAS COM A PORCA

O **PORCOMEL** é um alimento substituto do leite para leitões, fácil de dissolver, palatável e seguro.

Com a evolução da genética, existem cada vez maiores ninhadas por porca e cujos leitões têm tendência a ter pesos de nascimento inferiores. O **PORCOMEL** ajuda a garantir que os leitões recebem os nutrientes suficientes. A elevada inclusão de ácidos orgânicos favorece a digestão, bem como uma boa saúde gastrointestinal. O leite é completo, mantém a sua salubridade e os leitões habitua-se com muita facilidade ao sabor.

PROGRAMA ALIMENTAR PARA NINHADAS COM A PORCA


Para alimentação manual, desmame aos 21 dias



Para estimular a ingestão de alimentos secos antes do desmame e assegurar uma transição mais suave durante o desmame, é aconselhável reduzir gradualmente a quantidade de PORCOMEL a zero nos últimos 3 dias antes do desmame.

PROGRAMA ALIMENTAR PARA NINHADAS COM A PORCA

Para alimentação manual, desmame aos 28 dias



Para estimular a ingestão de alimentos secos antes do desmame e assegurar uma transição mais suave durante o desmame, é aconselhável reduzir gradualmente a quantidade de PORCOMEL a zero nos últimos 3 dias antes do desmame.



PORCOMEL

CERTIFIED the art of growing

INDICAÇÕES GERAIS

A REGRA DOS "3" - administrar colostro de alta qualidade:

1. o mais cedo possível
2. a maior quantidade possível
3. o mais frequentemente possível



- A temperatura ótima para beber é de 39°C, por isso verifique-a cuidadosamente. Para preparar o leite, deve dissolver primeiro o pó em 2/3 da quantidade de água a 45-50°C e de seguida adicione a água restante à temperatura ambiente, até atingir a temperatura de 39°C.
- A higiene é crucial: limpar cuidadosamente quaisquer materiais que entrem em contato com o leite. Fornecer apenas comedouros limpos e facilmente acessíveis (de preferência em forma redonda).
- Colocar à disposição água limpa e fresca.
- As quantidades do PORCOMEL podem ser ajustadas ao peso dos leitões, aumentando gradualmente desde o nascimento até ao desmame. A alimentação frequente de pequenas quantidades diminuirá a incidência de perturbações digestivas.
- Dar ração seca de alta qualidade a partir do dia 7-10 para estimular a ingestão de ração seca e facilitar o processo de desmame.
- Em caso de desmame precoce ou no caso de leitões fracos que não comem quantidades suficientes de ração seca, pode-se continuar a suplementação com o PORCOMEL (em combinação com ração seca) durante o máximo de 2 semanas após o desmame, para evitar uma queda no desempenho de crescimento.

