



Leites de substituição

CATÁLOGO ATUALIZADO



A close-up photograph of a cow's hindquarters. The cow has black and white fur. There is a large, irregular, reddish-orange lesion on the skin, which appears to be a skin condition or a wound. The lesion is located on the lower back area, near the tail. The text "RURAL PRO" is overlaid at the top in white, bold, sans-serif font, with a stylized fence icon between the words.

RURAL PRO

“Alimentação é parte importante no crescimento dos animais”

RuralPro

BEZERROS

LEITE DE SUBSTITUIÇÃO



01 BEZERROS

BEZERROS DEITADOS
NO



02 LEITE EM PÓ



03 COLHER COM LEITE EM PÓ

Fokkamel

extra



Indicações

Alimento substituto do leite para vitelos até 4 meses de idade

Apresentação física

Pó

Composição

Soro de leite 73% Proteína concentrada de soja* 6%

Gordura de coco 6% Óleo de palma 11%

Glúten de trigo 4%

* Produzido a partir de soja geneticamente modificada

04

FOKKAMEL EXTRA

Leite de substituição

Análise química

Proteína Bruta 21,0% // Gordura Bruta 16,0% // Celulose Bruta 0,2% // Cinza Bruta 8,0% // Fósforo 0,9% // Cálcio 0,95%

Aditivos: (por kg de produto)

Vitamina A	55 000 UI	Manganésio II (Sulf. Mono hidratado)	20
Vitamina D3	4 500 UI	Zinco (sulfato mono hidratado)	140
Vitamina E (alfa-tocoferol)	300 mg	Cobre II (sulf. Pentahidratado)	10
Vitamina B1	16 mg	Ferro II (Sulfato mono hidratado)	100
Vitamina B2	10 mg	Cobalto II (Sulfato heptahidratado)	2
Vitamina B6	8 mg	Iodo (Iodeto de potássio)	1
Vitamina B12	40 mcg	Selênio (selenito de sódio)	0,4
Vitamina C	300 mg	Ácido nicotínico	50,0
Vitamina K	5,5 mg	Formiato de cálcio	
Antioxidante BHT/BHA			

Modo de emprego

1. Por no misturador 2/3 da água total necessária para as refeições a uma temperatura de 50°C . Controle a temperatura com um termômetro.
2. Juntar a quantidade necessária de FOKKAMEL extra em pó(125 gramas por 900 ml de água), e misturar bem durante alguns minutos.
3. Acrescentar a restante água ate perfazer a quantidade total a uma temperatura de 37°C. Os vitelos devem ter à sua disposição água fresca e limpa assim como feno de boa qualidade.

Prazo de Validade

Fabricado 12 meses antes da data de durabilidade mínima indicada

Embalagem

Saco de 25 kg



Nukkamel

Yellow

05

NUKKAMEL YELLOW

Leite de substituição

Indicações

Alimento substituto do leite para vitelos até 4 meses de idade

Apresentação física

Pó

Composição

Soro de leite em pó, óleo e gordura vegetal refinada (palma/coco – 60/40), leite em pó, concentrado de proteína de soro de leite, proteína de trigo hidrolisada, óleo de linhaça

Análise química

Proteína Bruta 24,0% // Gordura Bruta 20,0% // Celulose Bruta 0,02% // Cinza Bruta 7,5% // Cálcio 0,7% // Imunoglobulinas 1500ppm // Fósforo 0,6% // Sódio 0,6%

Aditivos: (por kg de produto)

Vitamina A	25 000 UI	Manganésio II (Sulf. Mono hidratado)	40 mg
Vitamina D3	4 500 UI	Zinco (sulfato mono hidratado)	170 mg
Vitamina E (alfa-tocoferol)	300 mg	Cobre II (sulf. Pentahidratado)	10 mg
Antioxidante pg/BHA	30 mg	Ferro II (Sulfato mono hidratado)	150 mg
		Iodo (Iodeto de potássio)	1,3 mg
		Selênio (selenito de sódio)	0,4 mg
		<i>Bacillus subtilis</i>	1,3x 10 ⁹ UFC/kg
		<i>Enterococcus faecium</i>	2,5x 10 ⁹ UFC/kg

Modo de emprego

1. Por no misturador 2/3 da água total necessária para as refeições a uma temperatura de 50°C . Controle a temperatura com um termómetro.
2. Juntar a quantidade necessária de NUKAMEL YELLOW em pó(125 gramas por 900 ml de água), e misturar bem durante alguns minutos.
3. Acrescentar a restante água ate perfazer a quantidade total a uma temperatura de 37°C. Os vitelos devem ter à sua disposição água fresca e limpa assim como feno de boa qualidade.

Prazo de Validade

Fabricado 12 meses antes da data de durabilidade mínima indicada

Embalagem e dosagem

Saco de 25 kg // Diluir 0,125Kg de pó por 0,9 L de água

Porcomel



06

PORCOMEL

Leite de substituição

Indicações

Alimento substituto do leite acidificado para leitões até 3 meses

Apresentação física

Pó

Composição

Soro em pó, óleos vegetais (de palma/coco), maltodextrina e concentrado de proteína de trigo (hidrolisado)

Análise química

Gordura bruta 14 % // Proteína bruta 16 % // Cinza bruta 9,0 % // Fibra bruta 0.0 % // Cálcio 0.6 % // Fósforo 0.6 % // Sódio 0.6 % // Metionina 0.5 % // Lisina 1.3 %

Aditivos: (por kg de produto)

3a672a Vitamina A	25 000 UI
3a671 Vitamina D3	10 000 UI
3a700 Vitamina E	300 mg
3a300 Vitamina C	300 mg
E321 BHT	15 mg

Modo de emprego

Para a preparação da mistura, é necessário um terço da quantidade total de água necessária, aquecida a 60°C. Diluir o pó e misturar muito bem, acrescentado o resto da água (fria). A distribuição é feita à temperatura ambiente da instalação. Geralmente, é necessário manter uma concentração de 200 a 250 gr + 1 lt de água. Após a preparação do leite, fechar bem o saco e guardá-lo em local seco. O leite preparado PORCOMEL, conserva-se por um mínimo de 4 dias.

Prazo de Validade

Fabricado 12 meses antes da data de durabilidade mínima indicada

Embalagem e Dosagem

Saco de 10 kg // Diluir 200 - 250 gramas de pó por litro de água

Porcomel

Racionamento	Idade	Quantidade de leite
1ª semana		½ L-1 L/ ninhada por dia
2ª semana		1-2L/ ninhada por dia
3ª semana		2-4L/ninhada por dia
4ª semana		4L/ninhada por dia

Distribuição
1ª bebedouro
2º No reservatório
3º No reservatório
4ª No reservatório

- Distribuir PORCOMEL a todas as ninhadas desde o 2º dia.
- Renovar o leite todos os 2 dias. Os restos podem ser dados à porca.

07

PORCOMEL

Leite de substituição



- Passada 1 semana pode ser omitida a distribuição do PORCOMEL, em casos de ninhadas pouco numerosas ou porcas de alta lactação. Para as outras ninhadas continuar a distribuição de PORCOMEL através de reservatório ou bebedouro. Não distribuir mais do que a quantidade diária e não encher novamente o reservatório sem que este esteja vazio.
- Após as 4 semanas de idade, em princípio, não é mais necessária a distribuição do PORCOMEL. Quanto às ninhadas que nesse momento não tenham sempre consumido a quantidade necessária, continuar até às 5 semanas.
- Nos casos de desmame precoce (3 semanas) é melhor continuar com o PORCOMEL alguns dias após o desmame.
- O uso de granulados não muda o sistema acima mencionado. Como de costume os grânulos de iniciação serão postos à disposição dos leitões logo que estes tenham 10 – 21 dias de idade.
- Quando se utiliza o PORCOMEL não lavar mais do que uma vez por ninhada os bebedouros. Logo que a administração de PORCOMEL termine, deverá lavar profundamente os bebedouros.

Catálogo atualizado

RURAL PRO

